
Registreringer i Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP)

Registreres årlig eller annethvert år fra diagnose til 18 år (avhengig av alder og funksjon)
NorCP motorikk (fysioterapi, ergoterapi), NorCP røntgen



Registrering ved diagnose
NorCP medisinsk
NorCP kommunikasjon

Registrering ved 5 år
NorCP medisinsk
NorCP rtg rygg (GMFCS V)
NorCP kognisjon (CP*Cog)*
NorCP kommunikasjon

Registrering ved 12-13 år
NorCP kognisjon (CP*Cog)*
NorCP kommunikasjon

Registrering ved 15-17 år
NorCP medisinsk
NorCP kognisjon (CP*Cog*)
NorCP kommunikasjon
NorCP ePROM/ePREM
til foreldre og ungdom

NorCP kirurgi registreres når operasjon (ortopedi, ITB, SDR) er gjennomgått

Registrering av
NorCP motorikk fysioterapiprotokoll
NorCP motorikk ergoterapiprotokoll

1. **Barn klassifisert på GMFCS nivå I og MACS nivå I**
   Protokoll sendes inn **en gang per år t.o.m. 6 år,** deretter **annethvert år** ved 8, 10, 12, 14, 16 og 18 års alder

2. **Barn klassifisert på GMFCS nivå II-V og MACS nivå II-V**
   Protokoll sendes in **en gang per år** frem til 18 års alder

	1 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år	10 år	11 år	12 år	13 år	14 år	15 år	16 år	17 år	18 år
GMFCS I MACS I																		
GMFCS II-V MACS II-V																		

Registrering av
NorCP røntgenprotokoll (hofter)

- **GMFCS I:** ingen røntgenundersøkelse, forutsatt at klinisk undersøkelse ikke viser tegn til hofteutglidning
- **GMFCS II:** røntgenundersøkelse ved 2 år og 6 års alder.
  Hvis MP < 33%, og hvis klinisk undersøkelse ikke indikerer forverring, er det ikke behov for flere røntgenkontroller
- **GMFCS III-V:** Røntgenundersøkelse snarest ved mistanke om CP. Deretter årlig røntgen frem til 8 år. Videre røntgenundersøkelser vurderes individuelt.

- Barn med ren **ataxi eller choreoathetose** (GMFCS II-III) og uten tonusøkning:
  Ikke behov for røntgenoppfølging dersom første røntgenbilde er normalt.