


Registreringer i Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP)

Registreres årlig eller annethvert år fra diagnose til 18 år (avhengig av alder og funksjon)

NorCP motorikk (fysioterapi, ergoterapi), NorCP røntgen



NorCP kirurgi registreres når operasjon (ortopedi, ITB, SDR) er gjennomgått

Registrering av NorCP motorikk fysioterapiprotokoll NorCP motorikk ergoterapiprotokoll

- 1. Barn klassifisert på GMFCS nivå I og MACS nivå I**
Protokoll sendes inn **en gang per år t.o.m. 6 år**, deretter **annethvert år** ved 8, 10, 12, 14, 16 og 18 års alder
- 2. Barn klassifisert på GMFCS nivå II-V og MACS nivå II-V**
Protokoll sendes in **en gang per år** frem til 18 års alder

	1 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år	10 år	11 år	12 år	13 år	14 år	15 år	16 år	17 år	18 år
GMFCS I MACS I							Diagonal lines		Diagonal lines		Diagonal lines		Diagonal lines		Diagonal lines		Diagonal lines	
GMFCS II-V MACS II-V																		

Registrering av NorCP røntgenprotokoll (hofter)

- **GMFCS I:** ingen røntgenundersøkelse, forutsatt at klinisk undersøkelse ikke viser tegn til hofteutglidning
- **GMFCS II:** røntgenundersøkelse ved 2 år og 6 års alder.
Hvis MP < 33%, og hvis klinisk undersøkelse ikke indikerer forverring, er det ikke behov for flere røntgenkontroller
- **GMFCS III-V:** Røntgenundersøkelse snarest ved mistanke om CP. Deretter årlig røntgen frem til 8 år. Videre røntgenundersøkelser vurderes individuelt.
- Barn med ren **ataxi eller choreoathetose** (GMFCS II-III) og uten tonusøkning:
Ikke behov for røntgenoppfølging dersom første røntgenbilde er normalt.